UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU
FACULTÉ DE MÉDECINE

MODULE DE DERMATOLOGIE

LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES

Pr. I. TABLIT

PLAN

DÉFINITION

CLASSIFICATION

TABLEAU N°1 – LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES

TABLEAU N°2 – LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES PRIMAIRES

TABLEAU N°3 – LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES SECONDAIRES

Années Universitaires : **2019 - 2020**

LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES

DÉFINITION

- ***Modes de réponse*** de la peau aux différentes maladies et aux agressions qu'elle subit.
- ***Lésions les plus simples*** auxquelles on peut ramener les diverses affections cutanées et à l'aide desquelles on peut les décrire.
- ***Lésion individualisée assez facilement*** sans pouvoir être confondue avec une autre lésion.
- ***ABC ou alphabet*** de la dermatologie.

CLASSIFICATION

On distingue :

- ***Lésions primaires*** : qui apparaissent ***de novo***, comme les *macules*, les *papules* ou les *bulles*,
- ***Lésions secondaires*** : comme une *ulcération*, une *croûte* ou une *desquamation* qui résultent de l'***évolution des premières***.

Les lésions élémentaires sont classées principalement selon ***2 critères*** :

- Le ***caractère palpable ou non*** de la lésion (lésions primaires)
- La ***présence d'altération à la surface*** de la lésion.

D'autres éléments comme la ***consistance***, la ***température***, la ***mobilité*** ou la ***sensibilité*** des lésions doivent également être appréciés au cours de l'examen clinique.

Tableau 1 – Lésions élémentaires

Lésions élémentaires primaires		
Elles apparaissent DE NOVO		
Lésion non palpable		
- Macule		
Lésions palpables		
Lésions solides	- Papule - Tubercule - Nodule - Tumeur	- Nouure - Gomme - Végétation - Verrucosité
Lésions liquides	- Vésicule - Bulle - Pustule	
Lésions élémentaires secondaires		
Elles résultent de l'évolution des lésions primaires		
Altération de la surface de la peau		
- Erosion - Ulcération - Squames	- Croûtes - Gangrène – nécrose	
Modification de la consistance de la peau		
- Atrophie - Sclérose		

Tableau 2 – Lésions élémentaires primaires

Lésions élémentaires primaires	
Lésion non palpable : MACULE	
- Lésion visible, non palpable - Modification localisée de la couleur de la peau **sans** altération de sa surface - 5 à 20 mm diamètre - Classification selon leur couleur et les effets de la vitropression	
Types et définitions	Exemples
1. Macules dyschromiques : - Blanches - Brunes - Bleu-gris - Jaunes	 Vitiligo Ephélides (taches de rousseur) Tache mongolique Xanthome plan
2. Macules rouges 2. 1. Disparaissant à la vitropression 2. 1. 1. Erythème : - Rougeur localisée ou diffuse - Rose pâle au rouge foncé - Généralisé (>90%) - Mécanisme : ° Hyperhémie inflammatoire ° Dilatation permanente 2. 1. 2. Cyanose : - Teinte bleue violacée - Baisse de la température locale - Extrémités et muqueuses +++ 2. 2. Ne disparaissant pas à la VP 2. 2. 1. Purpura : - Rougeur permanente - Extravasation sg dans le derme - Circonscrit ou étendu - 2 types : ° Pétéchial ° Ecchymotique	 Exanthème maculo-papuleux (virus, mdcts) Exanthème morbiliforme (rougeole) Exanthème scarlatiniforme (scarlatine) « Erythrodermie » Cités ci-dessus Télangiectasies, Angiomes Hypoxie Fragilité vasculaire C.I.V.D

Tableau 2 – Lésions élémentaires primaires (suite)

Lésions élémentaires primaires	
Lésions palpables	
- Lésions perceptibles à la palpation - Distinguées selon : contenu (solide, liquide), taille, profondeur	
Lésions solides	
Types et définitions	Exemples
1. Papule : - Lésion palpable - A contenu non liquide - Taille < 10 mm	Verrue plane Acné Urticaire Syphilis (syphilides)
2. Tubercule : - Lésion palpable intradermique - Evolution chronique - Circonscrite et mobile	Syphilis tertiaire Lupus tuberculeux (tuberculose cutanée)
3. Nodule : - Lésion palpable - A contenu non liquide - Taille > 10 mm - Dermique et/ou hypodermique	Dermatofibrome Carcinome basocellulaire nodulaire
4. Tumeur : - Nodule > 20 mm - Sans caractère inflammatoire - Ayant tendance à croître	Toutes les tumeurs cutanées bénignes ou malignes
5. Nouure : - Nodule de grande taille (>5cm) - A extension hypodermique	Erythème Noueux
6. Gomme : - Nodule hypodermique - Passe par plusieurs phases : ° Phase de crudité (nouure) ° Phase de ramolissement ° Phase d'ulcération	Gomme syphilitique (syphilis tertiaire) Gomme tuberculeuse
7. Végétation : - Excroissance, molle - Saignant facilement (trauma)	Végétations vénériennes (condylomes)
8. Verrucosité : - Végétation à surface sèche, épaisse	Verrues vulgaires Kératose séborrhéique

Lésions élémentaires primaires	
Lésions liquides	
Types et définitions	Exemples
1. Vésicule : - Lésion palpable - A contenu liquide, clair - Taille < 3 mm	Eczéma Impétigo
2. Bulle : - Lésion palpable - A contenu liquide, clair ou louche ou hémorragique - Taille > 5 mm	Eczéma bulleux Impétigo bulleux Pemphigus, Pemphigoïde
3. Pustule : - Lésion palpable - A contenu liquide, d'emblée trouble ou purulent - Folliculaire ou non folliculaire	Acné, folliculite Psoriasis pustuleux

Tableau 3 – Lésions élémentaires secondaires

Lésions élémentaires secondaires	
Altération de la surface de la peau	
Types et définitions	Exemples
1. Erosion : - Perte de la partie superficielle de la peau (l'épiderme) - Guérit sans laisser de cicatrice - Lésion humide, suintante, se recouvrant ensuite d'une croûte, et dont le plancher est recouvert de multiples petits points rouges. - Fissure : érosion linéaire	Pemphigus (buccal) Syndrome de Lyell Herpès labial
2. Ulcération : - Perte de substance cutanée plus profonde qui touche l'épiderme et le derme - Guérit en laissant une cicatrice ; - Elle peut se recouvrir d'un enduit fibrineux, d'une croûte sérosanglante (une ulcération peut saigner) ou d'une plaque noire (nécrose). - Ulcère : perte de substance chronique sans tendance à la guérison spontanée. - Escarre : ulcération aux points de pression	Ulcère de jambe Chancre mou
3. Squames : - Lamelles de cellules cornées (épiderme) à la surface de la peau. - Elles sont peu adhérentes et se détachent facilement. - Elles sont visibles spontanément ou après grattage à l'aide d'une curette à bord mousse.	Psoriasis vulgaire Dermite séborrhéique (pellicules)
4. Croûte : - Dessèchement superficiel d'un exsudat, d'une sécrétion, d'une nécrose ou d'une hémorragie cutanée. - Elle adhère +/- aux lésions qu'elle recouvre, mais elle peut toujours être détachée à la curette.	Herpès labial Impétigo
5. Gangrène-nécrose : - Portion de tissu cutanée non viable qui tend à s'éliminer. - Elles se caractérisent par une perte de la sensibilité, un refroidissement puis, secondairement, une coloration noire et la formation d'un sillon d'élimination entre les tissus nécrosés et les tissus sains.	Purpura nécrotique (CIVD) Nécrose cutanée due aux médicaments (anticoagulants)

Modification de la surface	
Types et définitions	Exemples
1. Atrophie : - Diminution ou disparition de tout ou partie des éléments constitutifs de la peau (épiderme, derme, hypoderme ou deux, voire trois compartiments). - Elle se présente comme un amincissement du tégument qui se ride au pincement superficiel, perdant son élasticité, son relief et prenant un aspect lisse et nacré. - Les vaisseaux dermiques sont souvent visibles.	Vergetures Atrophie cutanée due aux médicaments (injection IM CTC)
2. Sclérose : - Augmentation de consistance des éléments constitutifs du derme et parfois de l'hypoderme, rendant le pincement des téguments plus difficile. - Le tégument est induré et perd sa souplesse normale.	Sclérodermie Chéloïde